

Brin d'herbe

Conseils de saison sur la gestion de l'herbe, des fourrages, du pâturage ...

POINT TECHNIQUE ABORDE CETTE SEMAINE

LE DEPRIMAGE : à faire ou à ne pas faire cette année ???

Avant d'aborder le thème technique d'actualité, chaque semaine, vous trouverez, en premier point de votre Brin d'herbe, le **bulletin de la pousse de l'herbe régional** (également diffusé les vendredis dans le Paysan Lorrain).


BULLETIN DE LA POUSSE DE L'HERBE

Les suivis de mesures de la pousse de l'herbe ont repris pour cette année en Lorraine sur les différents sites de fauches ou de pâturage.

En Meurthe-et-Moselle, vous trouverez les sites de fauche à **Rozelleures** et **Neuviller sur Moselle** et les sites de pâturage à **Thelod** et **Ceintrey** en système lait et à **Chenicourt** en système allaitant (tous les sites ne sont pas encore mis en route pour les mesures, à suivre...).

Les éleveurs éloignés de ces sites peuvent se référer aux sites suivis à proximité de chez eux dans les autres départements.

DES REPERES POUR LA CONDUITE DES PRAIRIES




Les voyants s'allumeront en vert au fur et à mesure que le cumul de températures se fera.

NB : En moyenne sur l'ensemble du territoire nous sommes à 250 °C jours cumulés depuis le 1er février, de ce fait, aucun voyant n'apparaît en vert sur l'échelle de repère de gestion de la conduite des prairies.

Pousse de l'Herbe (Kg MS/j/Ha)



Carte où vous trouverez les différentes croissances par site



Cinétique de la pousse de l'herbe en Lorraine

En bleu, vous trouverez la courbe de croissance de 2019 qui va se construire de semaine en semaine en comparaison de celle de 2018.

Ces mesures permettent d'adapter la conduite au contexte de l'année :

- Dois-je arrêter le déprimage ?
- Dois-je charger plus mes parcelles qu'en 2018 où je me suis fait déborder au printemps ?
- ...

COMMENTAIRE DE LA SEMAINE :

Si nous avons connu des températures très printanières il y a 10 jours, les giboulées de mars ont bien fait redescendre le thermomètre stoppant, par la même occasion, la croissance qui redémarrait tout juste.

Pour les parcelles où l'engrais a été épandu, le retour du soleil permettra un bon démarrage de la végétation par une bonne valorisation des apports. Pour ceux qui n'ont pas saisi ce créneau, les apports sont à réaliser dès le retour de la portance.

En attendant, profitez de ce temps pour : prévoir l'organisation du pâturage (chargements des parcelles), refaire vos clôtures et choisir vos espèces à semer pour les semis de printemps.



LE DEPRIMAGE

Les quelques jours de beau temps d'il y a 10 jours ont incité certains éleveurs à lâcher des animaux. La pousse de l'herbe étant très faible voire quasi nulle, il s'agit bien évidemment d'un déprimage.

Le principe est une exploitation précoce de l'herbe sous forme pâturée, avant le stade « épi à 5 cm » !

Le déprimage permet d'améliorer la qualité des repousses en favorisant le tallage et éventuellement de faire consommer l'herbe non pâturée avant l'hiver (l'herbe non exploitée qui a subi le froid et le gel perd de la valeur). Il permet également d'économiser sur les stocks de fin d'hiver en sortant tôt certaines catégories d'animaux au pâturage.

En résumé : On déprime si on a de l'herbe à consommer et une portance !

Après les surpâturages de fin de saison de 2018, un bon nombre de parcelles ne présentent pas ces caractéristiques et l'intérêt de déprimer sera limité !

Si vous avez les conditions réunies, les conseils sont en page 3 !

➤ Intérêts du déprimage :

=> **Améliorer la qualité du fourrage** en favorisant le tallage des graminées et en augmentant la proportion de feuilles. Les feuilles de graminées étant coupées par les dents de l'animal, le plateau de tallage restera plus bas et accédera à plus de lumière. La production de nouvelles talles sera favorisée et les tiges seront moins hautes et plus appétentes.

=> Donner de la lumière au trèfle blanc en nettoyant l'herbe âgée.

=> **Décaler la période de fauche** de 5 à 10 jours sans pénaliser la qualité en jouant sur le retardement du stade épi 10 cm. La récolte de foin pourra potentiellement se faire dans de meilleures conditions.

=> Pour les parcelles pâturées, le déprimage évite de gaspiller de l'herbe plus tard: consommation précoce de la pousse hivernale en freinant les espèces les plus précoces, et création d'un **décalage de pousse entre paddocks** avant de démarrer le pâturage tournant pour ceux qui le pratiquent.

➤ Quelles sont les parcelles à déprimer !

La décision est à prendre en fonction de l'utilisation future de la prairie :

=> Pour les **parcelles récoltées en foin, en pâturage continu ou dynamique**, le déprimage est à effectuer dès que le terrain porte et le retour du beau temps.

=> **Pour les parcelles en fauche précoce** (ensilage ou enrubanné), **celui-ci n'est pas conseillé**. Le rendement en fauche précoce serait pénalisé et donc sans intérêt économiquement.

➤ Stade de déprimage !

L'important est de mettre à l'herbe **sur une prairie portante** afin que les animaux ne marquent pas le couvert végétal !

Peu importe la hauteur d'entrée dans la parcelle, l'important est de **sortir des parcelles avec une faible hauteur d'herbe** : 4 à 5 cm à l'herbomètre, soit hauteur du talon.

➤ Fin de déprimage

Fin de déprimage possible dès 500°C jours (car après l'épi sera monté et il s'agira d'étêtage). Le passage doit être rapide : **pas plus de 10 jours sur une même parcelle**.

Attention, dès début avril, il faudra impérativement recharger les parcelles pour arriver à des chargements adéquats avec la pousse de l'herbe qui va exploser ! (références des réseaux à respecter : point dans les prochains bulletins).

VOS CONSEILLERS



Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92.



J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65.

Julien LORENT / 06.72.75.71.69.



Florian BOYER / 06.07.83.68.79.

Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40.



Laurent KELLER / 06.82.69.83.41.



Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90.

